Orientações Gerais para Alimentação de Crianças e Adultos com Perturbações do Espectro do Autismo

INTRODUÇÃO

Eliminar os alimentos ultra-processados da sua alimentação é o primeiro passo para conseguir um melhor desenvolvimento integral. Isto é válido quer tenha ou não um diagnóstico de Perturbação do Espectro do Autismo (PEA), mas é particularmente importante para quem está no espectro. É a base que vai permitir que todas as estratégias que lhe vou indicar a baixo funcionem de forma sinérgica.

No meu trabalho, como terapeuta da fala, personalizo cada uma destas estratégias para a realidade dos meus clientes. Alguns têm alergias, outros tem seletividade alimentar, uns são ligeiramente hipertónicos, outros ligeiramente hipotónicos, cada um deles tem gostos próprios. Assim, de acordo com a individualidade de cada um podem ter de ser feitos ajustes a cada uma destas linhas orientadoras.

Estas orientações são o resultado de uma evolução no meu trabalho terapêutico, e são a base da aplicação do paradigma do desenvolvimento integral à terapia da fala, para pessoas com PEA.

Orientações Gerais para Alimentação de Crianças e Adultos com Perturbações do Espectro do Autismo

Cada orientação é relativamente simples de implementar e não tem efeitos secundários. A exceção pode ser alguma condição alérgica, por favor tenha isso em atenção antes de aplicar mudanças na alimentação. Em caso de dúvida consulte o seu médico.

Estas orientações não pretendem sobrepor-se às indicações médicas ou de outros profissionais de saúde, apenas as complementam criando uma base para que todas as terapias e tratamentos tenham melhores resultados. Essa base é a saúde integral.

Criei esta checklist para os meus clientes, que depois personalizo consoante as necessidades, e para todas as pessoas que enfrentem desafios idênticos na vida possam ter acesso ao conhecimento do paradigma do desenvolvimento integral.

Viva integralmente,

Checklist

REGULAÇÃO DA ENERGIA

- Pequeno-almoço com cereais integrais cozinhados, que proporcionem uma libertação lenta dos hidratos de carbono.
- Substituir o uso de açúcar por ágave, que tem baixo índice glicémico, ou outro equiparável.
- Usar bolachas e bolos caseiros (diminuir a quantidade de açúcar e usar farinhas integrais) ou, no caso das bolachas e bolos de compra, que sejam indicados para pessoas diabéticas.
- Pão integral de massa-mãe

TOXICIDADE

- 70% da alimentação com alimentos Biológicos, e 30% alimentos não-biológicos.
- Água alcalina (pH superior a 7).

LIGAÇÃO INTESTINO-CÉREBRO

- Após o lanche da tarde, fazer uma alimentação sem glúten e com alguns alimentos alcalinos.
- Substitua o leite de origem animal por bebida vegetal de amêndoa (ou de aveia, no entanto a amêndoa melhor por ser mais alcalina).
- Algumas vezes por semana, opte por kefir biológico em vez do iogurte. Existem opções de kefir de cabra, ovelha e vaca. Cada uma delas tem as suas vantagens, por isso o ideal é ir variando a qualidade do kefir.

+ INFORMAÇÕES E MARCAÇÕES EM:

www.andreiaferreiracampos.com